



Amino-18

氨基酸 18



包装 Pakej: 一 1 升, 5 升 / 1Liter, 5Liter

成分: 大豆氨基酸提取物

Kandungan: Ekstrak amino asid daripada soya

Produced by:

Ken Microbes Biotech Sdn Bhd

No. 7 Jalan Permata 9A/KS09, Taman Perindustrian Air Hitam Phase 2, , 41200 Klang, Selangor

功能/作用/ FUNGSI

含有机成分，含有高浓度的大豆提取物。用于各种植物并增加植物的质量和数量。它提高了叶子的光合作用速率，增加了叶子的绿度。

Mengandungi kandungan yang berorganik dan mengandungi kepekatan ekstrak soya yang tinggi. Digunakan untuk pelbagai tumbuhan dan meningkatkan kualiti dan kuantiti tumbuhan. Ia meningkatkan kadar fotosintesis daun dan meningkatkan kehijauan daun.

使用说 / CARA PENGGUNAAN

每 5-7 天或根据植物需要，将 1L 加入 1000L 水中进行叶面喷施。

1L dalam 1000L air digunakan secara foliar setiap 5-7 hari atau ikut keperluan tumbuhan.

注意事项 / LANGKAH BERJAGA

鼓励与其他叶面混合。

Digalakkan campur dengan foliar yang lain.

最好在早上或晚上使用。

Terbaik digunakan pada pagi atau petang.

使用前请摇匀，用水稀释后使用。

Goncang produk sebelum guna, guna habis selepas dicairkan dengan air.

可以与化学杀菌剂和杀虫剂混合。

Boleh campur dengan racun kulat kimia dan racun perosak.





Seaweed Extract

海藻精华



KEN MICROBES BIOTECH

包装 Pakej: 一 1 升, 5 升 / 1Liter, 5Liter

成分: 高海藻提取物, 富含微量营养素
Kandungan: Ekstrak rumpai laut tinggi, diperkayakan dengan mikronutrien

Produced by:

Ken Microbes Biotech Sdn Bhd
No. 7 Jalan Permata 9A/KS09, Taman Perindustrian Air Hitam Phase 2, , 41200 Klang, Selangor

功能/作用/ FUNGSI

含有能刺激多种植物的有机生物活性化合物。致力于增加果实的大小，加速果实生产的过程，增加根的生长并提高花朵的形成率。

Mengandungi sebatian bioaktif organik yang dapat merangsangkan pelbagai tumbuhan. Berfungsi untuk meningkatkan saiz buah-buahan, mempercepatkan proses penghasilan buah, meningkatkan pertumbuhan akar dan meningkat kadar pembentukan bunga.

使用说明 / CARA PENGGUNAAN

每 5-7 天或根据植物需要，将 1L 加入 1000L 水中进行叶面喷施。

1L dalam 1000L air digunakan secara foliar setiap 5-7 hari atau ikut keperluan tumbuhan.

注意事项 / LANGKAH BERJAGA

鼓励与其他叶面混合。

Digalakkan campur dengan foliar yang lain.

最好在早上或晚上使用。

Terbaik digunakan pada pagi atau petang.

使用前请摇匀，用水稀释后使用。

Goncang produk sebelum guna, guna habis selepas dicairkan dengan air.

可以与化学杀菌剂和杀虫剂混合。

Boleh campur dengan racun kulat kimia dan racun perosak.





Supra Calbo

高钙硼



包装 Pakej: — 1 升, 5 升/ 1Liter, 5Liter

成分: 15% 钙 EDTA、12% 氮、1% 硼、
2.5% 镁、10% 有机物

Kandungan: 15% Calcium EDTA, 12%
Nitrogen, 1% Boron, 2.5% Magnesium,
10% bahan organik

Produced by:

Ken Microbes Biotech Sdn Bhd
No. 7 Jalan Permata 9A/KS09, Taman
Perindustrian Air Hitam Phase 2, , 41200
Klang, Selangor

功能/作用/ FUNGSI

避免和减少叶子坏死、根部瘀伤、真菌侵袭、树干脆弱和生长发育不良非常重要。一般在开花、结果期间使用较多。还能增加果皮的硬度。

Amat penting untuk mengelak dan mengurangkan nekrosis daun, lebam akar, serangan kulat, batang pokok lemah dan pertumbuhan terencat. Biasa akan lebih digunakan masa berbunga dan berbuah. Juga meningkatkan kekerasan kulit buah.

使用说明 / CARA PENGGUNAAN

每 5-7 天或根据植物需要, 将 1L 加入 1000L 水中进行叶面喷施

1L dalam 1000L air digunakan secara foliar setiap 5-7 hari atau ikut keperluan tumbuhan.

注意事项 / LANGKAH BERJAGA

鼓励与其他叶面混合。

Digalakkan campur dengan foliar yang lain.

最好在早上或晚上使用。

Terbaik digunakan pada pagi atau petang.

使用前请摇匀, 用水稀释后使用。

Goncang produk sebelum guna, guna habis selepas dicairkan dengan air.

可以与化学杀菌剂和杀虫剂混合。

Boleh campur dengan racun kulat kimia dan racun perosak.





Completed Trace

微量元素



KEN MICROBES BIOTECH

包装 Pakej: 一 1 升, 5 升/ 1Liter, 5Liter

成分: EDTA (Fe:4.2%, Mg:5.3%, Cu:1.5%,
Zn:1.5%, Mn:2%, B:0.7%, Mo:0.1%, HA:9.5%)
Kandungan: EDTA (Fe:4.2%, Mg:5.3%, Cu:1.5%,
Zn:1.5%, Mn:2%, B:0.7%, Mo:0.1%, HA:9.5%)

Produced by:

Ken Microbes Biotech Sdn Bhd
No. 7 Jalan Permata 9A/KS09, Taman
Perindustrian Air Hitam Phase 2, , 41200
Klang, Selangor

功能/作用/ FUNGSI

微量营养素是植物所需的元素。Completed Trace 含有完整的营养成分，可满足植物需求，提高果实产量和品质。Micronutrien adalah unsur yang diperlukan oleh tumbuhan. Completed Trace mengandungi kandungan nutrisi yang lengkap bagi memenuhi keperluan tumbuhan, mempertingkatkan hasilan buah dan kualiti.

缺乏营养会导致生长下降、代谢紊乱和易受疾病侵袭。

Kekurangan nutrisi akan menyebabkan kemerosotan tumbesaran, gangguan metabolisme, dan mudah terdedah kepada serangan penyakit.

使用说 / CARA PENGGUNAAN

1L 加入 1000L 叶面水中，每 7-10 天一次或当有微量元素缺乏症状时

1L dalam 1000L air foliar, setiap 7-10 hari atau bila ada gejala kekurangan trace element

注意事项 / LANGKAH BERJAGA

鼓励与其他叶面混合

Digalakkan campur dengan foliar yang lain.

最好在早上或晚上使用

Terbaik digunakan pada pagi atau petang.

使用前请摇匀，用水稀释后使用

Goncang produk sebelum guna, guna habis selepas dicairkan dengan air.

可以与化学杀菌剂和杀虫剂混合

Boleh campur dengan racun kulat kimia dan racun perosak.





KMB WhiteCal

植奶钙

包装 Pakej: 1 升/1L

成分: 碳酸物质、溶解腐植酸盐物质

Kandungan: Calcium Oxide 500g/L,
Magnesium+Boron > 3%



KEN MICROBES BIOTECH

Produced by:

Ken Microbes Biotech Sdn Bhd
No. 7 Jalan Permata 9A/KS09, Taman
Perindustrian Air Hitam Phase 2, , 41200
Klang, Selangor

功能/作用/ FUNGSI

降低叶片坏死率，增加果实、叶片硬度。它也很稳定，不与其他微量元素相互作用。

Mengurangkan kadar nekrosis daun, meningkatkan kekerasan buah dan daun. Ia juga stabil dan tidak berinteraksi dengan micro elemen lain.

先进的悬浮剂技术可防止分层、沉降和品质变化，与弱酸性和碱性农药/肥料具有良好的混溶性。

Teknologi ejen penggantungan termaju menghalang stratifikasi, pemendapan dan perubahan kualiti, dengan kebolehcampuran yang sangat baik yang serasi dengan racun perosak/baja yang berasid lemah & beralkali.

使用说 / CARA PENGGUNAAN

每 7-10 天用 1L 加入 1000L 水中进行叶面喷施

1L dalam 1000L air digunakan secara foliar setiap 7-10hari

注意事项 / LANGKAH BERJAGA

鼓励与其他叶面混合

Digalakkan campur dengan foliar yang lain.

最好在早上或晚上使用

Terbaik digunakan pada pagi atau petang.

使用前请摇匀，用水稀释后使用

Goncang produk sebelum guna, guna habis selepas dicairkan dengan air.





Fulmino-K



KEN MICROBES BIOTECH

包装 Pakej: 1 升/1L

成分: 可溶钾、黄腐酸、氨基酸

Kandungan: Potassium Soluble, Fulvic acids, Amino acids

Produced by:

Ken Microbes Biotech Sdn Bhd

No. 7 Jalan Permata 9A/KS09, Taman Perindustrian Air Hitam Phase 2, , 41200 Klang, Selangor

功能/作用/ FUNGSI

提高钾需求量高的特定作物的内部和外部质量，以实现微量营养素的均衡供应。它还可以提高疾病和花卉的抗性。

Menambah baik kualiti dalaman dan luaran tanaman khusus dengan keperluan K yang tinggi untuk bekalan mikronutrien yang seimbang. Ia juga meningkatkan ketahanan penyakit dan bunga.

使用说 / CARA PENGGUNAAN

1000L 水中的 1L 用于叶面喷施，在开花时使用最有效

1L dalam 1000L air digunakan secara foliar, paling berkesan digunakan pada masa berbunga.

注意事项 / LANGKAH BERJAGA

鼓励与其他叶面混合

Digalakkan bercampur dengan foliar yang lain.

最好在早上或晚上使用

Terbaik digunakan pada pagi atau petang.

使用前请摇匀，用水稀释后使用

Goncang produk sebelum guna, guna habis selepas dicairkan dengan air.

可以与化学杀菌剂和杀虫剂混合

Boleh campur dengan racun kulat kimia dan racun perosak.





KMB-GA3



包装 Pakej: 1 公斤/1kg

成分: 赤霉酸

Kandungan: Gibberelic Acids (GA3)

Produced by:

Ken Microbes Biotech Sdn Bhd

No. 7 Jalan Permata 9A/KS09, Taman Perindustrian Air Hitam Phase 2, 41200 Klang, Selangor

功能/作用/ FUNGSI

含有纯赤霉酸 (GA3) 的植物增强剂。它显著影响茎伸长、发芽、开花、酶的产生以及叶和果实的成熟。

Penggalak tumbuhan yang mengandungi Gibberelic Acids (GA3) yang tulen. Ia mempengaruhi secara ketara pemanjangan batang, percambahan, pengeluaran bunga, pengeluaran enzim dan kematangan daun dan buah.

使用说 / CARA PENGGUNAAN

植物 Tanaman	20 liter air	喷涂时间 Masa penyemburan
大米、玉米 Padi, Jagung	7.5gram – 10 gram	第一：花形成时间 第二次：每两周一次 1 st : Waktu Pembentukan Bunga 2 nd : Selang 2minggu sekali
芒果、木瓜 Mangga, Betik	7.5gram – 10gram	第一期：开花初期 第二次：每两周一次 1 st : Peringkat awal pembungaan 2 nd : Selang 2 minggu sekali
辣椒、茄子、长豆 Cili, Terung, Kacang Panjang	10gram – 15 gram	第一：果实形成后 7 天 第二次：每两周重复一次 1 st : 7 hari lepas pembentukan buah 2 nd : Ulang setiap 2 minggu
榴莲和可可 Durian dan Koko	15gram – 20 gram	第一期：开花初期 第二次：每两周一次 1 st : Peringkat awal pembungaan 2 nd : Dua minggu sekali
西瓜和黄瓜 Tembikai dan timun	10gram – 20 gram	第 1 次：2 片叶子长出时 10 克 第二次：当果实有高尔夫球大小时为 20 克 1 st : 10g apabila keluar 2 pucuk daun 2 nd : 20g apabila buah sebesar bola golf

注意事项 / LANGKAH BERJAGA

请勿与碱性毒物混放。Tidak boleh dicampurkan dengan racun bersifat alkali.

肥水充足时效果良好。不能代替肥料。Kesan yang baik apabila baja dan bekalan air mencukupi.

Tidak boleh menggantikan baja.



Oligo-Chitosan

高浓甲壳素



KEN MICROBES BIOTECH

包装 Pakej: 一 1 升, 5 升 / 1Liter, 5Liter

成分: 高浓甲壳素

Kandungan: Oligo Chitosan

Produced by:

Ken Microbes Biotech Sdn Bhd

No. 7 Jalan Permata 9A/KS09, Taman

Perindustrian Air Hitam Phase 2, , 41200

Klang, Selangor

功能/作用/ FUNGSI

它以虾、蟹和贝壳为原料。该产品含有甲壳素/壳聚糖，对激活植物防御系统催化剂非常有效。

la berasaskan dari kulit udang, ketam dan kerang-kerangan. Produk ini mengandungi chitin/chitosan yang sangat berkesan mengaktifkan pemangkin system pertahanan dalam tumbuhan.

保护植物免受真菌、细菌和病毒性疾病的侵害。也可用于移栽期和播种期。

Mengelakkan tumbuhan daripada penyakit fungus, bakteria dan virus. Juga boleh digunakan masa tempoh transplan dan penyemaian.

使用说 / CARA PENGGUNAAN

叶面喷施: 1L 加入 1000L 水中 7-10 天或根据植物需要

Foliar: 1L dalam 1000L air 7-10 hari atau mengikut keperluan tumbuhan

雨季广泛使用。

Banyak digunakan pada musim hujan.

注意事项 / LANGKAH BERJAGA

鼓励与其他叶面混合

Digalakkan campur dengan foliar yang lain.

最好在早上或晚上使用

Terbaik digunakan pada pagi atau petang.

使用前请摇匀，用水稀释后使用

Goncang produk sebelum guna, guna habis selepas dicairkan dengan air.

可以与化学杀菌剂和杀虫剂混合

Boleh campur dengan racun kulat kimia dan racun perosak.

避免与硫酸铜一起使用

Elak digunakan bersama dengan kuprum sulfat.

