



KMB-GA3



KEN MICROBES BIOTECH

包装 Package: 1 公斤/1kg

成分: 赤霉酸

Contents: Gibberelic Acids (GA3)

Produced by:

Ken Microbes Biotech Sdn Bhd

No. 7 Jalan Permata 9A/KS09, Taman Perindustrian Air Hitam Phase 2, , 41200 Klang, Selangor

功能/作用/ FUNCTIONS

含有纯赤霉酸 (GA3) 的植物增强剂。它显著影响茎伸长、发芽、开花、酶的产生以及叶和果实的成熟。

A plant booster containing pure Gibberelic Acids (GA3). It significantly affects stem elongation, germination, flower production, enzyme production and leaf and fruit maturation.

使用说明 / HOW TO USE

植物 Crops	20 Liters of Water	喷涂时间 Spraying time
大米、玉米 Paddy, Corn	7.5grams – 10 grams	第一：花形成时间 第二次：每两周一次 1 st : Flowering period 2 nd : Once every two weeks
芒果、木瓜 Mango, Papaya	7.5grams – 10grams	第一期：开花初期 第二次：每两周一次 1 st : Early stage of flowering 2 nd : Once every 2 weeks
辣椒、茄子、长豆 Chili, Brinjal, Long beans	10grams – 15 grams	第一：果实形成后 7 天 第二次：每两周重复一次 1 st : 7 days after fruiting 2 nd : : Once every 2 weeks
榴莲和可可 Durian and Cocoa	15grams – 20 grams	第一期：开花初期 第二次：每两周一次 1 st : Early stage of flowering 2 nd : Once every 2 weeks
西瓜和黄瓜 Watermelon and Cucumber	10grams – 20 grams	第 1 次：2 片叶子长出时 10 克 第二次：当果实有高尔夫球大小时为 20 克 1 st : 10g when 2 leaves appear 2 nd : 20g when fruit is golfball-sized

注意事项 / PRECAUTIONS

请勿与碱性毒物混放。Cannot be mixed with alkaline poisons.

肥水充足时效果良好。不能代替肥料。

Good effect when fertilizer and water supply are sufficient. Cannot replace fertilizer.