



# PEST GUARD 2

## 复合苏白菌

包装 Pakej: 一公斤/1 kg

可湿性粉剂 (粉状)

Serbuk boleh basah

有效成分: 苏云菌杆菌, 白僵菌

$1 \times 10^{10}$ cfu 孢子/克

Bahan Aktif: *Bacillus thuringiensis*

*Beauveria bassiana*:  $1 \times 10^{10}$ cfu/g



KEN MICROBES BIOTECH

Produced by:

**Ken Microbes Biotech Sdn Bhd**

No. 7 Jalan Permata 9A/KS09, Taman  
Perindustrian Air Hitam Phase 2, , 41200  
Klang, Selangor

## 功能/作用/ FUNGSI

复配两种天然菌株，主要通过昆虫表皮接触感染，其次也可经消化道和呼吸道感染，让昆虫死亡。

Gabungan dua strain mikrob semula jadi, jangkitan melalui sentuhan kulit dengan serangga, dan kedua, ia juga boleh dijangkiti melalui saluran penghadaman dan saluran pernafasan dan menyebabkan kematian.

菜青虫、玉米螟、稻叶蝉、地下害虫(蓟马蛹, 蝇虫, 甲虫蛹等)。

Ulat kobis, pengorek jagung, Lalat putih, Perosak bawah tanah (thrip pupae, serangga lalat, pupa kumbang, dll).

## 使用说 / CARA PENGGUNAAN

叶面喷洒: 1: 800-1000 倍 (7-10 天/次)。Foliar Daun: 1:800-1000 (7-10 hari/se kali) .

拌细土或有机肥 2 公斤/英亩, 均匀撒施后整理土地。2kg/ekar dicampurkan tanah halus atau baja organik, ditabur rata.

土壤灌根: 1-2 公斤/英亩 (一次/月)。Irrigasi/fertigasi: 1-2kg/ekar (1 bulan sekali).

## 注意事项 / LANGKAH BERJAGA

可配合其它生物农药使用，加速杀虫速度。Boleh digunakan dengan pestisida biologi lain untuk mempercepatkan kesan.

需要早期防治。用量更高，效果更理想，也不会影响作物。Pencegahan dan rawatan awal diperlukan. Dos yang lebih tinggi akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan tidak akan menjelaskan tanaman.

不可混合杀菌剂使用，以免益菌被杀死。Elakkan campuran dengan antibiotik/pembasmi kuman lain yang boleh menjelaskan kesan produk.

一个侵染周期 4-7 天。是种缓性的杀虫剂，所以需要早期，预防性的使用。Kitaran jangkitan adalah 4-7 hari. Ia adalah racun serangga yang bertindak perlakan, penggunaan secara pencegahan awal diperlukan.



棕榈树啃叶虫  
Beg Worm



蕈蚊幼虫 Fungus Gnat



菜青虫 Ulat Kobis



白粉虱 Ulat Puuri