



# PEST GUARD 3

## 苏云金特杆菌

包装 Paket: 一公斤/1 kg

可湿性粉剂 (粉状)  
Serbuk boleh basah

有效成分: 苏云金特菌孢子粉  $1 \times 10^{10}$  cfu 孢子/克  
Bahan Aktif: Bacillus thuringiensis spore  
 $1 \times 10^{10}$  cfu/g



Produced by:  
**Ken Microbes Biotech Sdn Bhd**  
No. 7 Jalan Permata 9A/KS09, Taman  
Perindustrian Air Hitam Phase 2, , 41200  
Klang, Selangor

### 功能/作用/ FUNGSI

以胃毒作用为主。使害虫停止取食，最后因饥饿，中毒而死亡

Menyebabkan ketoksikan perut, menyebabkan perosak berhenti makan, dan akhirnya mati kerana kelaparan dan keracunan

有效于菜青虫、白粉虱幼虫。对土壤的蕈蚊幼虫有一定的抑制作用

Berkesan pada ulat kubis dan larva whitefly. Mempunyai kesan perencatan tertentu pada larva cendawan tanah

### 使用说 / CARA PENGGUNAAN

叶面喷洒: 1: 800-1000 倍 (7-10 天/次) Foliar Daun: 1:800-1000 (7-10 hari/sekali)

拌细土或有机肥 2 公斤/英亩, 均匀撒施后整理土地 2kg/acre dicampurkan tanah halus atau baja organik, ditabur rata.

### 注意事项 / LANGKAH BERJAGA

可配合其它生物农药使用, 加速杀虫速度。Boleh digunakan dengan pestisida biologi lain untuk mempercepatkan kesan.

需要早期防治。用量更高, 效果更理想, 也不会影响作物。Pencegahan dan rawatan awal diperlukan. Dos yang lebih tinggi akan menghasilkan hasil yang lebih baik dan tidak akan menjaskankan tanaman.

不可混合杀菌剂使用, 以免益菌被杀死。Elakkan campuran dengan antibiotic/pembasmi kuman lain yang boleh menjaskankan kesan produk

对害虫的低龄幼虫效果好。随配随用, 从稀释到使用, 一般不要超过 2 小时, 使用间隔 10-15 天。

Kesan yang baik terhadap larva muda perosak. Ia sedia untuk digunakan kerana ia disediakan. Secara amnya, ia tidak boleh melebihi 2 jam dari pencairan untuk digunakan, dan selang antara penggunaan adalah 10-15 hari.



菜青虫 Ulat Kobis



行军虫 Army Worm



蕈蚊幼虫 Fungus Gnat



白粉虱幼虫  
Larva Ulat Putih